

هشدارها:

- اگر نسبت به سرتاکونازول و دیگر داروهای ضد قارچ مانند کلوتریمازول، کنتوکونازول، مایکونازول و ترکیبات تشکیل دهنده کرم و یا هر داروی دیگری حساسیت دارید به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.
 - در صورت داشتن شرایط خاص دارویی پزشک را مطلع کنید.
 - در مورد مصرف ویتامین ها، مکمل های غذایی و محصولات گیاهی، پزشک یا داروساز را در جریان قرار دهید تا در صورت لزوم، دوز دارو تعدیل شود و عوارض جانبی پیگیری گردد.
 - در صورت پیشروی علائم تحریک پوستی، قرمزی، خارش، تورم و غیره درمان را قطع کنید و به پزشک اطلاع دهید.
 - کارائی و ایمنی مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۱۲ سال ثابت نشده است.
- هر دارو برای یک بیمار تجویز می شود بنابراین برای جلوگیری از آلودگی و انتقال عفونت اجازه ندهید داروی شما را دیگران استفاده کنند.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در گروه C می باشد. مطالعات کافی در زمینه تاثیر این دارو در دوران بارداری و شیردهی انجام نشده است، بنابراین برای تجویز این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید مزایا و و معایب دارو سنجیده شود .

شرایط نگهداری دارو:

دارو در دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها سرتاکونازول را با نام تجاری سرتول[®]، به شکل کرم موضعی در تیوب های ۳۰ گرمی و درون جعبه به همراه برگه راهنما عرضه می کند.
هر ۱۰۰ گرم کرم حاوی ۲ گرم سرتاکونازول نیتрат می باشد.

Sertol[®] 2% Sertaconazole

سرتول[®] ۲ درصد سرتاکونازول

دسته دارویی: ایمیدازول ها

شکل دارویی: کرم موضعی

موارد مصرف:

کرم سرتول[®] جهت درمان تینایدیس (عامل عفونت قارچی پای ورزشکاران و بین انگشتان) به کار می رود. سرتاکونازول جزء دسته ایمیدازول ها می باشد و باعث کاهش رشد قارچ می شود. این دارو علاوه بر اثر ضد قارچ دارای اثر ضد التهابی، ضد باکتری و ضد خارش نیز می باشد.

فارماکوکینتیک:

مطالعه فارماکوکینتیک چند دوزی نشان داد که ۷۲ ساعت پس از مصرف دارو، جذب سیستمیک آن ناچیز است.

مکانیسم اثر:

مکانیسم دقیق دسته دارویی ایمیدازول ها کاملاً مشخص نیست. به نظر می رسد که در مرحله اول با مهار کردن سنتز ارگوسترول وابسته به سیتوکروم P450 عمل می کنند. ارگوسترول یک ترکیب کلیدی در ساخت دیواره سلولی قارچ است که کمبود آن باعث تخریب دیواره سلولی می شود. مطالعات بالینی نشان داده است که سرتاکونازول در مقابل میکرو ارگانیسم های زیر نیز موثر می باشد:

Trichophyton rubrum, Trichophyton mentophytes, Epidermophyton floccosum

مقدار و نحوه مصرف:

- سرتول[®] به صورت موضعی ۲ بار در روز به مدت ۴ هفته استفاده می شود. با مقدار کافی از کرم، سطح ناحیه عفونی شده بین انگشتان و پوست سالم اطراف آن پوشیده شود.

- اگر علائم بیماری بعد از دو هفته بهبود پیدا کرد، درمان تا کامل شدن دوره، ادامه پیدا کند.

- اگر مصرف دارو زودتر از اتمام دوره درمان قطع گردد، ممکن است عفونت کاملاً برطرف نشود و علائم برگشته و یا بدتر شود.

- در صورت کامل کردن دوره درمان و عدم بهبود علائم پس از گذشت دو هفته از درمان، به پزشک اطلاع دهید.

- کرم سرتول[®] فقط برای مصرف روی پوست می باشد، لذا از مصرف آن در اطراف چشم، بینی، دهان، لب ها و داخل دهان و یا بصورت واژینال و رکتال خودداری کنید.

- برای مصرف دارو ابتدا دست ها را بشوئید، سپس محل آسیب دیده را تمیز و خشک کنید و کرم را به آرامی در محل موضع بمالید.

- از پوشاندن محل آسیب دیده و یا بانداز بهره‌زید مگر زمانی که به دستور پزشک باشد.

اگر مصرف یک دوز را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن دارو را استفاده کنید مگر اینکه نزدیک دوز بعدی باشد. از زیاد کردن دوز بعدی اجتناب کنید.

عوارض جانبی:

در صورت بروز عوارض زیر و برطرف نشدن آنها به پزشک اطلاع دهید:

خارش، سوزش در محل استفاده، خشکی پوست

در صورت مشاهده هریک از عوارض زیر سریعاً به پزشک اطلاع دهید:

قرمزی، حساسیت شدید، تورم، درد و احساس گرما در محل استفاده دارو، تاول، وریکول.

کرم سرتول[®] ممکن است باعث عوارض دیگری نیز بشود، در صورت بروز مشکل غیر معمول به پزشک اطلاع دهید.