

تریادنت ۰/۱ درصد® Teriadent® 0.1 %

Triamcinolone

تریامسینولون

ترکیبات : هر ۱۰۰ گرم حاوی ۰/۱ گرم تریامسینولون استوناید

شکل دارویی : خمیر دهانی

دسته دارویی : کورتیکواستروئید

اثر درمانی: بهبود زخم ها و التهابات دهانی غیر هرپسی، ضایعات اوسرانیو و آفت های مکرر دهانی، ضایعات لته، زینژبوت و درمان ضایعات لیکن پلانوس

راهنمایی های عمومی :

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- ✱ در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده رنگی یا ماده محافظ یا هر یک از ترکیبات دارو
- ✱ در صورت بارداری و شیردهی، ابتلا به هرپس سیمپلکس، عفونتهای پوستی توپروکولار، عفونتهای پوستی ویروسی
- ✱ در صورت مصرف داروهای کورتیکواستروئید

مصرف در دوران بارداری و شیر دهی :

✱ تجویز این دارو در دوران بارداری و شیر دهی تحت نظر پزشک صورت می گیرد.

هشدارها :

- ۱- مصرف مداوم طولانی مدت یا نا به جای استروئیدهای موضعی می تواند منجر به بروز التهاب عود کننده پس از توقف درمان شود (سندروم قطع مصرف استروئید موضعی). یک فرم از التهاب عودکننده می تواند به صورت درمانیت همراه با قرمزی شدید، درد و سوزش بروز پیدا کند که تا اطراف محل اولیه ی درمان گسترش یابد. این واکنش زمانی که استروئید موضعی در نواحی دارای پوست حساس و نازک مثل صورت و نواحی چین دار مصرف شود، بیشتر احتمال دارد رخ دهد. تکرار این شرایط به صورت واکنش پس از قطع مصرف دارو، طی روزها تا هفته های پس از درمان موفقیت آمیز باید در نظر گرفته شود. در این موارد توصیه می شود استعمال مجدد استروئیدهای موضعی همراه با احتیاط و به توصیه ی پزشک انجام شود و یا داروی دیگری جایگزین گردد.
- ۲- به منظور حداکثر اثر دارو پماد را بعد از غذا و در موقع خواب به موضع بمالید، بعد از مصرف دارو از خوردن و آشامیدن خودداری کنید.
- ۳- در هنگام استعمال پماد در موضع آنرا روی زخم فشار دهید، از مالش پماد خودداری کنید.
- ۴- دوره درمان را کامل کنید و طولانی تر استفاده نکنید. استفاده زیاد بر روی پوست سبب آتروفی پوست می شود.
- ۵- برای درمان عفونت و یا پیشگیری از عفونت مجدد اقدامات بهداشتی از جمله خشک و خنک نگهداشتن محل ضروری است.
- ۶- استفاده طولانی مدت در کودکان و اطفال سبب تاخیر در رشد می شود. تجویز آن در کودکان حتماً تحت نظر پزشک باشد.
- ۷- در صورتی که پس از یک هفته علائم بهبودی مشاهده نشد با پزشک خود مشورت کنید.


مقدار و نحوه مصرف دارو :

قبل از مصرف ابتدا محل آسیب در دهان را خشک کنید. سپس مقدار کمی از پماد را بصورت یک لایه نازک توسط انگشت یا اپلیکاتور تمیز بر روی محل بگذارید. پماد را بر روی محل فشار دهید. از مالش پماد خودداری کنید. پماد را بعد از غذا و موقع خواب ۲-۳ بار در روز به موضع بمالید تا مدت زمان بیشتری در تماس با محل باشد. بعد از مصرف دارو از خوردن و آشامیدن خودداری کنید.


داخل جعبه پماد یک اپلیکاتور موجود میباشد. پس از باز کردن درپوش تیوب برای اولین بار و باز کردن آلومینیوم ســـــ تیوب (شکل ۱)، اپلیکاتور را بجای آن بر روی تیوب ببیچانید و برای دفعات بعدی به همین حالت بمانند (شکل ۲). برای استعمال تریادنت، درپوش اپلیکاتور را برداشته و خمیر را از سرنسازل اپلیکاتور بر روی محل قرار دهید (شکل ۳).



شکل ۳



شکل ۲



شکل ۱

عوارض جانبی :

احتمالاً بروز عوارض جانبی دارو در کودکان بیشتر است.

در صورت استفاده طولانی مدت در سطح وسیع ممکن است عوارض دارو بصورت علائم حساسیت، آکنه یا پوست چرب، افزایش رشد مو بخصوص در صورت افزایش ریزش مو بخصوص در کف سر و آتروفی پوست بروز یابد.

شرایط نگهداری دارو :

✱ دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید و از یخ زدگی محافظت نمایید.

✱ دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

بسته بندی :

شرکت داروسازی رها تریامسینولون را به شکل خمیر دهانی ۰/۱٪ و با نام تجاری تریادنت®، در تیوبهای ۱۰ گرمی و درون جعبه به همراه

برگه راهنما عرضه میکند.