

Tizanidine

تیزانیدین

شکل دارویی: قرص ۴ میلی گرمی

دسته دارویی: ضد اسپاسم

موارد مصرف و آثار درمانی: درمان گرفتگی و اسپاسم عضلانی حاد یا متناوب به ویژه در مولتیپل اسکلروزیس و صدمات نخاعی

- مطالعات کلینیکی نشان می دهد، تیزانیدین گرفتگی عضله را بدون ایجاد ضعف عضلانی، کاهش می دهد.
- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

(الف) راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید.

۱- در صورت سابقه حساسیت به این دارو

۲- در صورت مصرف الکل و یا داروهای جلوگیری کننده از بارداری، فنی توئین، داروهای موثر بر اعصاب و روان و داروهایی که سبب افت فشار خون می شوند.

۳- در صورت ابتلا به نارسائی کلیوی و نارسائی کبدی

(ب) مصرف در دوران بارداری و شیر دهی:

دردوران بارداری و شیردهی فقط با نظر و تجویز پزشک مصرف شود. (C FDA Pregnancy category)

(پ) هشدارها:

- ❖ ایمنی و کارائی این دارو در کودکان زیر ۱۲ سال ثابت نشده است.
- ❖ مصرف این دارو در بیماران مسن که مستعد بیماریهای کبدی، کلیوی و یا قلبی هستند با احتیاط صورت گیرد.
- ❖ در هنگام مصرف دارو ممکن است دچار خشکی دهان شوید، لذا برای بهبودی از آدامس بدون شکر، شکلات یا یخ استفاده کنید و در صورت تداوم بیش از دو هفته با پزشک یا دندانپزشک خود مشورت کنید.
- ❖ این دارو ممکن است سبب منگی، سرگیجه و احساس سبکی در سر شود، لذا در هنگام مصرف و ۲۴ ساعت پس از قطع مصرف دارو از رانندگی و انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری و دقت دارد خودداری کنید.
- ❖ هنگام بلند شدن از وضعیت نشسته یا خوابیده ممکن است دچار افت فشار خون شوید.
- ❖ قبل از قطع دارو حتماً به پزشک خود مراجعه کنید.
- ❖ در صورت فراموش کردن یک بار مصرف دارو به محض پید آوردن، در صورتیکه نزدیک مصرف دوز بعدی نباشد، آن را میل کرده و از دوبرابر کردن مقدار مصرف خودداری کنید.

(ت) عوارض جانبی:

این دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند.

تب، عفونت ادراری، اریتمی، مسمومیت کبدی، اثر بر سیستم عصبی، هیپوتیروئیدیسم، سنگ کلیه، سنکوپ، عفونت تنفسی فوقانی، اختلالات بینائی، تغییرات خلق و خوی، خونریزی دستگاه گوارش، ناهنجاری های خونی، زخم های پوستی.

(ث) تداخلات دارویی:

تیزانیدین با داروهای زیر تداخل دارد: CNS دپرسانت ها، آمپودارون، مگزولتین، پروپافنون، سایمتیدین، فلوروکینولون ها، تیکلوپیدین، فلووکسامین، داروهای القا کننده هیپوناتسیون از جمله آگونیست های α_2 آدرنرژیک، داروهای ضد بارداری خوراکی، فنی توئین، روفکوکسیب.

(ج) مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو توسط پزشک تعیین میشود. دوز معمول دارو برای بزرگسالان ۸ میلی گرم هر ۶ تا ۸ ساعت میباشد.

(چ) موارد منع مصرف:

❖ حساسیت به داروی تیزانیدین

❖ نقص عملکرد کلیه

(ح) مسمومیت دارویی:

بیمار را وادار به استفراغ کرده و سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

(خ) شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

(د) بسته بندی:

شرکت داروسازی رها تیزانیدین را بصورت قرص در بلیستر و درون جعبه به همراه بروشور بسته بندی و به بازار عرضه میکند.
هر قرص حاوی ۴ میلیگرم تیزانیدین هیدروکلراید میباشد.