

تریامسینولون ان.ان. Triamcinolone N. N.

شکل دارویی : پماد موضعی

دسته دارویی : ضد التهاب، ضد باکتری، ضد قارچ

اثر درمانی :

درمان عفونتهای باکتریایی، قارچی و درمان کاندیدیاز پوستی، التهابات همراه با عفونت کاندیدیایی یا باکتریایی و درمان‌های مقاوم همانند پسوریازیس که عفونت ثانویه باکتریایی یا کاندیدیایی وجود داشته باشد.

راهنمایی‌های عمومی :

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید :

- ❖ در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو ، غذا ، ماده رنگی یا ماده محافظ یا هر یک از ترکیبات دارو
- ❖ در صورت بارداری و شیردهی ، ابتلا به هرپس سیمپلکس، عفونتهای پوستی توپرکولار، عفونتهای پوستی ویروسی
- ❖ در صورت مصرف سایر داروهای کورتیکواستروئید

مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

تجویز این دارو در دوران بارداری و شیردهی تحت نظر پزشک صورت می گیرد.

این دارو در گروه C از گروه بندی FDA قرار دارد.

هشدارها :

- ۱- مصرف مداوم طولانی مدت یا تا به جای استروئیدهای موضعی می تواند منجر به بروزالتهاب عود کننده پس از توقف درمان شود (سندروم قطع مصرف استروئید موضعی). یک فرم از التهاب عودکننده می تواند به صورت درمانیت همراه با قرمزی شدید، درد و سوزش بروز پیدا کند که تا اطراف محل اولیه ی درمان گسترش یابد. این واکنش زمانی که استروئید موضعی در نواحی دارای پوست حساس و نازک مثل صورت و نواحی چین دار مصرف شود، بیشتراحتمال دارد رخ دهد.تکرار این شرایط به صورت واکنش پس از قطع مصرف دارو ، طی روزها تا هفته های پس از درمان موفقیت آمیز باید در نظر گرفته شود.در این موارد توصیه می شود استعمال مجدد استروئیدهای موضعی همراه با احتیاط و به توصیه ی پزشک انجام شود و یا داروی دیگری جایگزین گردد.
- ۲- این دارو تنها برای مصرف موضعی است از مصرف آن در چشم و اطراف آن خودداری کنید.
- ۳- پس از استعمال پماد در موضع روی آنرا نپوشانید و یا از پارچه ظریف برای پوشاندن آن استفاده کنید.
- ۴- دوره درمان را کامل کنید و طولانی تر استفاده نکنید. استفاده زیاد برروی پوست سبب آتروفی پوست می شود.
- ۵- برای درمان عفونت و یا پیشگیری از عفونت مجدد اقدامات بهداشتی از جمله خشک و خنک نگهداشتن محل ضروری است.
- ۶- استفاده طولانی مدت در کودکان و اطفال سبب تاخیر در رشد می شود. تجویز آن در کودکان حتماً تحت نظر پزشک باشد.
- ۷- در موارد نادری ممکن است در اثر مصرف طولانی در بیماران دیابتی هایپرگلیسمی ایجاد شود. قبل از تغییر دوز داروی دیابت با پزشک مشورت کنید.

مقدار و نحوه مصرف دارو :

پماد تریامسینولون ان.ان. را یک یا دوبار در روز به موضع بمالید.

در اطفال کمتر از ۲ سال مصرف این محصول توصیه نمی شود.

موارد منع مصرف :

سابقه آلرژی و حساسیت به این دارو یا سایر کورتیکواستروئیدهای موضعی.

عوارض جانبی:

احتمال بروز عوارض جانبی دارو در کودکان بیشتر است.

علائم آن شامل حساسیت ، آکنه یا پوست چرب ، افزایش رشد مو بخصوص در صورت ، افزایش ریزش مو بخصوص در کف سر ، آتروفی پوست.

شرایط نگهداری دارو :

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

بسته بندی :

شرکت داروسازی رها تریامسینولون ان.ان. را به شکل پماد در تیوبهای آلومینیومی ۱۵ گرمی و درون جعبه به همراه بروشور عرضه می کند.
هر ۱۰۰ گرم پماد حاوی ۱۰۰ میلی گرم تریامسینولون استوناید، ۱۰۰۰۰۰۰۰ واحد نیستاتین و ۲۵۰ میلی گرم نئومایسین (به صورت سولفات) میباشد.