



شرکت داروسازی رها
RAHAPHARMA. CO.



نمائیید. • از برخاستن ناگهانی از وضعیت خوابیده یا نشسته خودداری نمائیید. • احتمال بروز خشکی دهان و گلو و بینی وجود دارد که در این موارد می توان از آدامس یا یخ استفاده نمود، اگر خشکی دهان بیش از ۲ هفته ادامه یافت به پزشک مراجعه نمائیید. • در صورت مصرف این دارو در ناحیه پا، لکه های شبکه مانند به رنگ قرمز مایل به ارغوانی بر روی پوست ایجاد می گردد این لکه ها در عرض ۲ تا ۱۲ هفته پس از قطع دارو به تدریج از بین می رود.

• در صورت مصرف همزمان هر گونه داروی دیگر با این دارو حتماً به پزشک خود اطلاع دهید. • در صورت ابتلاء به بیماری های عروقی مغز، اکڑما، صرع، بیماری های قلبی عروقی و ... در مورد مصرف این دارو با پزشک مشورت نمائیید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو توسط پزشک و بر اساس شرایط بیمار تعیین می گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به حوالات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته بشود. اگر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد اما در صورت بروز هر یک از آن ها با پزشک خود مشورت نمائیید:

✓ عوارض شایع :

اشکال در تمرکز، سرگیجه، تحریک پذیری، کاهش اشتها، تهوع، عصبانیت، ایجاد لکه های شبکه مانند به رنگ قرمز مایل به ارغوانی بر روی پوست، اشکال در بخواب رفتن یا کابوس های شبانه.

✓ عوارض یا شیوع کمتر:

اغتشاش فکر بخصوص در بیماران مسن، توهم، تغییرات خلقی یا روانی، اشکال در دفع ادرار خصوصاً در بیماران مسن، از حال رفتن، تاری دید، پیوست، خشکی دهان، بینی و گلو، سردرد، خستگی یا ضعف غیر عادی.

✓ عوارض نادر:

تشنج، تغییر در بینایی، اشکال در تطابق، تحریک و تورم چشم ها، افسردگی، راش پوستی، تورم پاها، تنگی تنفس.

مسمومیت:

در صورت بروز مسمومیت، بیمار را وادار به استفراغ کرده و هر چه سریعتر به بیمارستان مسمومین منتقل نمائیید.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمائیید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمائیید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها آماتنادین ۱۰۰ را با نام تجاری ویرالس® ۱۰۰ و به شکل کپسول به صورت بلیستر، درون جعبه همراه با برگه راهنما عرضه می نماید.

www.rahapharm.com

CAP.LFT.VIRALESS/100.03

اصفهان - کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی مفتح ، واحد ۱۱

مستحقق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵

فکس: ۰۹۵۹-۳۶۵۴۰۳۱-۳۱(+۹۸)

اصفهان - کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی مفتح ، واحد ۱۱

مستحقق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵

فکس: ۰۹۵۹-۳۶۵۴۰۳۱-۳۱(+۹۸)



شرکت داروسازی رها
RAHAPHARMA. CO.



Viraless® 100

Amantadine

ویرالس® ۱۰۰

آمانتادین

شکل دارویی: کپسول

ترکیبات: آمانتادین هیدروکلراید ۱۰۰ میلی گرم

دسته دارویی: ضد پارکینسون، ضد ویروس (اگونیست دوپامین)

موارد مصرف: پیشگیری و درمان آنفلوانزا نوع A، کاهش عوارض خارج هرمی در اثر مصرف داروها، پارکینسون، کاهش خستگی در مولتیپل اسکلروز (MS)

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائیید:

• در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده رنگی یا ماده محافظ.

• در صورت ابتلاء به بیماری هایی نظیر: اکڑما، صرع، بیماری های قلبی، کلیوی، عصبی، ادم.

• در صورت مصرف همزمان هر نوع دارو از جمله داروهای آنتی کولینرژیک، داروهای محرک سیستم عصبی مرکزی، کینیدین، کینین، کوتیریموکسازول.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در رده C بارداری از طبقه بندی FDA قرار دارد.

این دارو در بارداری و شیردهی منع مصرف دارد مگر با صلاحدید پزشک متخصص.

هشدارها:

• در پیشگیری از آنفلوانزا، مصرف این دارو بهتر است قبل از تماس یا بلافاصله بعد از تماس با افرادی که دچار آنفلوانزا هستند شروع گردد. • دوره درمان را کامل کنید حتی اگر بعد از چند روز بهبودی نسبی حاصل نمائیید. • در درمان عفونت های ویروسی مصرف تمام مقادیر دارو در وقت معین دارای اهمیت می باشد و هیچ یک از نوبت های مصرف نباید فراموش شود. در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو فراموش گردید به محض به یاد آوردن آن را مصرف نمائیید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد آن را مصرف نکرده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید. • در صورت عدم بهبود عفونت ویروسی پس از چند روز به پزشک مراجعه نمائیید. • دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نمائیید. • در درمان دیسکینزی در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن آن را مصرف نمائیید ولی اگر کمتر از چهار ساعت به زمان نوبت بعدی باقی مانده است آن را مصرف نکرده، نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید. • بهبود علائم بیماری معمولاً بعد از ۲ روز آشکار می گردد ولی ممکن است در بعضی افراد تا ۲ هفته به طول انجامد. • در صورت بهبود دیسکینزی ، فعالیت فیزیکی را باید تدریجاً شروع نمود. • در صورت کاهش تدریجی اثر دارو در درمان دیسکینزی به پزشک مراجعه نمائیید. • قبل از قطع درمان دیسکینزی با این دارو به پزشک مراجعه کنید زیرا ممکن است کاهش تدریجی مقدار مصرف دارو ضرورت داشته باشد. • ممکن است این دارو باعث سرگیجه، گیجی، اغتشاش شعور یا تاری دید گردد، لذا در انجام کارهایی که احتیاج به هوشیاری دارد نظیر رانندگی احتیاط

www.rahapharm.com

CAP.LFT.VIRALESS/100.03

اصفهان - کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی مفتح ، واحد ۱۱

مستحقق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵

فکس: ۰۹۵۹-۳۶۵۴۰۳۱-۳۱(+۹۸)

اصفهان - کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی مفتح ، واحد ۱۱

مستحقق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵

فکس: ۰۹۵۹-۳۶۵۴۰۳۱-۳۱(+۹۸)