

Voldic® 50

Diclofenac Sodium

ولدیک® ۵۰

دیکلوفناک سدیم

شکل دارویی: قرص اتنریک کتد ۵۰ میلی گرم
دسته درمانی: ضد التهاب غیر استروئیدی
اثر درمانی: مسکن و ضد التهاب

راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- ۱- در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو ، غذا ، ماده رنگی یا ماده محافظ
- ۲- در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر: اختلالات خونی ، آسم ، کولیت ، نارسایی کلیه ، کبد ، کم خونی ، تپش قلب ، فشارخون ، پورفیریا ، ورم فوزک یا ، کپهر
- ۳- در صورت مصرف هرگونه دارو از جمله سایمتیدین ، سالیسیلاتها ، داروهای ضد انعقاد ، داروهای ضد فشارخون ، داروهای ضد صرع ، سیکلوسپورین ، پنی سیلایمین ، متوترکسات ، داروهای ضد دیابت و انسولین.

مصرف در دوران بارداری و شیر دهی:

این دارو در دوران بارداری و شیردهی به هیچ وجه بدون صلاحدید پزشک مصرف نشود.

هشدارها

- ۱- در صورت بروز اسهال ، مصرف دارو را قطع کنید و با پزشک خود مشورت کنید.
- ۲- در صورت قرار گرفتن در معرض نور آفتاب ، احتمال آفتاب سوختگی شدید ، خارش و راش پوستی وجود دارد ، بنابر این در معرض آفتاب مستقیم قرار نگیرید. از لباس های محافظ ، کلاه ، عینک و ضد آفتاب استفاده کنید.
- ۳- بیمارانی که نسبت به استیل سالیسیلیک اسید (مانند آسپرین) یا سایر داروهای ضد درد و ضدالتهاب غیر استروئیدی عدم تحمل نشان می دهند ممکن است دیکلوفناک را تحمل نکنند. در صورت بروز واکنش های آلرژی که با علائم تنفس نامنظم ، نیض نامنظم ، تورم و تغییر رنگ صورت به پزشک خود مراجعه کنید.
- ۴- دیکلوفناک ترجیحاً پس از غذا یا همراه غذا یا با داروهای ضد اسید معده مصرف شود تا تحریک گوارشی کاهش یابد.
- ۵- توصیه می شود این دارو همراه یک لیوان آب مصرف شود و بمدت ۳۰-۱۵ دقیقه پس از مصرف دارو دراز نکشید.
- ۶- در صورت مصرف دیکلوفناک بدون دستور پزشک از مصرف طولانی مدت آن خودداری کنید.
- ۷- در صورت بروز دل درد شدید ، مدفوع قیری ، تهوع شدید ، سوزش سر دل ، سوء هاضمه ، استفراغ خونی یا اجسام شبیه به دانه های قهوه ای ، مصرف دارو را قطع کرده به پزشک مراجعه کنید.
- ۸- در موارد نادر در صورت بروز علائم آنفلوآنزا بعد از خوردن دارو یا بروز راش پوستی با پزشک مشورت کنید.
- ۹- در هنگام تجویز این دارو برای بیمارانی که از نظر مصرف سدیم محدودیت دارند ، میزان سدیم قرص دیکلوفناک سدیم باید مدنظر قرار گیرد.
- ۱۰- از خرد کردن و شکستن این دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای بشود ، گر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز هر کدام از آنها با پزشک خود مشورت کنید.

عوارض گوارشی: درد شدید معده ، سوزش سر دل ، اسهال ، مدفوع سیاه رنگ یا قیری ، احساس تجمع گاز در شکم.

عوارض کلیوی: دفع مشکل ادرار ، تکرر ادرار ، ادرار خونی.

عوارض عصبی: خواب آلودگی ، گیجی ، عصبانیت.

واکنش های حساسیتی: کپهر، خس خس سینه، خارش پوست، تنگی نفس.

عوارض خونی: کم خونی ، کمی پلاکت های خون ، ضربان غیر عادی قلب.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند و باید دقیقاً از آن پیروی کرد. مقدار مصرف معمول این دارو به نوع بیماری بستگی دارد:

مقدار مصرف در درمان آرتريت روماتوئید ۱۰۰-۷۵ میلی گرم در روز می باشد.

مسمومیت دارویی:

در صورت مصرف بیش از مقدار تجویز شده بیمار را وادار به استفراغ کرده و هر چه سریعتر به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها قرص دیکلوفناک ۵۰ را با نام تجاری ولدیک® را درون جعبه بسته بندی و به بازار عرضه می نماید.