ولدیک® ۰/۱ درصد Voldic® 0.1%

دیکلوفناک Diclofenac

شکل دارویی : قطره چشمی

دسته دارویی : ضد درد و ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID)، مهارکننده سنتز پروستاگلندین

موارد مصرف و آثار درمانی :

رفع درد، خارش، قرمزی، التهاب و حساسیت به نور، بویژه بعد از جراحی کاتاراکت،کونژنکتیویت،کراتوکونژنکتیویت و زخم قرنیه.
پیشگیری از میوز در حین جراحی های چشم (به همراه داروهای دیگر میدریاتیک).
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایی‌های عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمائید:

- در صورت سابقه حساسیت به هرگونه دارو و سابقه قبلی حساسیت به این دارو.
- در صورت سابقه آلرژی از جمله آنافیلاکسی، برونکو اسپاسم، آنژیوادم، رینیت آلرژیک و کهیر، راش پوستی و سرگیجه با مصرف دیگر مسکن ها (NSAIDs) مثل ایبوپروفن، ناپروکسن، سلکوکسیب و آسپیرین.
- در صورت سابقه مشکلات خونی از جمله خونریزی یا اختلالات انعقادی یا در صورت مصرف وارفارین و هپارین.
- در صورت داشتن دیابت، آرتریت روماتوئید و یا مشکلات چشمی (مثل خشکی چشم، گلوکوم و افزایش فشار داخل چشم).
- در صورت داشتن سابقه جراحی های مکرر چشم

مصرف در دوران بارداری و شیر دهی :

این دارو در طبقه C از FDA قرار دارد، استفاده از قطره چشمی دیکلوفناک سدیم به ویژه در اواخر دوران بارداری به دلیل ریسک بسته شدن داکتوس آرتریوزوس توصیه نمی شود.
در دوران شیردهی دارو در شیر ترشح می شود و مصرف آن بهتر است با توصیه پزشک انجام شود.

هشدارها :

- در صورت حساسیت به آسپرین و دیگر NSAID ها، این دارو بایستی با احتیاط مصرف شود.
- هنگام مصرف این دارو احتمال بروز خونریزی در بافت های چشمی وجود دارد، لذا در بیماران مستعد به خونریزی یا بیماران تحت درمان با داروهای ضد انعقادی، بایستی با احتیاط مصرف شود.
- مصرف همزمان با داروهای ضد ویروس هرپس با احتیاط انجام گردد.
- از مصرف همزمان لنز های تماسی نرم خودداری کنید.
- در مصرف همزمان با داروهای استروییدی زمان بهبود زخم افزایش می یابد.

موارد منع مصرف :

از لنزهای نرم هیدروژل در زمان مصرف قطره دیکلوفناک، به علت ایجاد التهاب چشم از جمله قرمزی و سوزش، استفاده نشود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد، در صورت بروز هریک ازآنها با پزشک خود مشورت کنید.
کرانیت، افزایش فشار داخلی چشم (IOP)، ادم قرنیه و کموز.
عوارض جانبی ذیل در صورت ایجاد نیار به توجه پزشکی دارند:
واکنش های آلـرژیک، کدورت قرنیه، تاری دید، ترشح بیش از حد از چشـم که باعث چسبندگی مژه ها شود،ادم صورت، تب و یا کاهش درجه حرارت بدن، حساسیت به نور، تهوع، استفراغ و درد.

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱ ، صندوق پستی ۵۶۷-۸۱۷۴۵ تلفن: ۳۶۵۴۰۲۵۹-۳۱(۰۹۱۸)
فاکس: ۳۶۵۴۰۱۵۶-۳۱(۰۹۱۸) www.rahapharm.com

عوارض زیر در صورت تداوم نیاز به توجه پزشکی دارند:
ضعف غیر طبیعی، سردرد، بی خوابی، میوز (کوچک شدن مردمک)، میدریاز (بزرگ شدن مردمک) و ریـنیـت (آبریزش بینی).

مقدار و نحوه مصرف دارو :

- برای درمان التهاب بعد از جراحی کاتاراکت:
یک قطره در چشم ملتهب، ۴ بار در روز ۲۴ ساعت پس از عمل جراحی تا ۲ هفته (بسته به نظر پزشک، تا ۶ هفته نیز ممکن است ادامه یابد).
- برای درمان کونژنکتیویت،کراتوکونژنکتیویت ، زخم های قرنیه یا التهاب پس از زخم :
یک قطره در چشم ملتهب، ۴ تا ۵ بار در روز استفاده می شود که بسته به شدت التهاب و با توجه به نظر پزشک متفاوت است.
- برای پیشگیری و کاهش میوز در طول جراحی چشم و ادم ماکولار بعد از جراحی :
یک قطره داخل چشم، تا ۵ بار در روز (۳ساعت قبل از جراحی، ۱۵ دقیقه ، ۳۰ دقیقه و ۴۵ دقیقه بعد از جراحی و سپس ۳ تا ۵ بار در روز تا زمانی که نیاز است).
- درمان فوتوفوبیا پس از اعمال جراحی انکساری چشم:
یک قطره یک ساعت قبل از عمل جراحی سپس یک قطره ۱۵ دقیقه پس ازعمل جراحی و بعد از گذشت ۶-۴ ساعت از عمل جراحی ۴ بار در روز به مدت ۳ روز.

برای مصرف دارو سر را قدری به سمت عقب خم کنید. پلک پایین را با انگشت گرفته و مقداری به سمت جلو بکشید.(شکل ۱). یک قطره از محلول را در حفره پلک پایین بچکانید(شکل ۲). در حالی که سمت پایین را نگاه می کنید چشـم را به آرامی ببندید(شکل ۳). به مدت ۳- ۵ دقیقه گوشه داخلی چشم خود را به کمک انگشت شست به سمت بینی فشار دهید. چشـم را بسـته نگه دارید و داروی اضافی خارج شده را با دستمال تمیز پاک کنید (شکل ۴).
از تماس نوک قطره چکان با چشم یا هر سطح دیگری خودداری کنید. در صورت استفاده از لنز تماسی نرم قبل از مصرف دارو لنز را از چشـم خود خارج نموده و ۱۵ دقیقه بعد از مصـرف دارو مجدداً آن را در چشـم قراردهید. در صورت نیاز به استفاده از داروهای چشـمی دیگر بین مصرف آن ها با این دارو ۱۰ دقیقه فاصله دهید. در صورت فراموشی استفاده در یکی از نوبت ها، دارو را به محض یادآوری مصـرف کنید ، ولی از دو برابرکردن مقدار مصرفی خودداری نمایید.

شکل (۱)

شکل (۲)

شکل (۳)

شکل (۴)

تداخلات دارویی :

- کارباکول: اثر کـارباکـول که در پیشـگیری از میـوز در حـین جـراحی چشـم به کار می رود، در صورتیکه پس از یک قطـره چشمی NSAID استفاده شود، ممکن است کاهش یابد.
- داروهای ضد انعقاد خون، کومارین، هپارین و دیگر مهار کننده های تجمع پلاکتی: احتمال خون ریزی افزایش می یابد.

شرایط نگهداری دارو :

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد در ظروف در بسته نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

بسته بندی :

شرکت داروسازی رها دیکلوفناک را با نام تجاری ولدیک ® ۰/۱ درصد به شکل قطره چشمی، در ظروف پلی اتیلنی ۵ میلی لیتری درون جعبه و به همراه بروشور عرضه میکند.

EYE.LFT.VLD0.1/010.09

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱ ، صندوق پستی ۵۶۷-۸۱۷۴۵ تلفن: ۳۶۵۴۰۲۵۹-۳۱(۰۹۱۸)
فاکس: ۳۶۵۴۰۱۵۶-۳۱(۰۹۱۸) www.rahapharm.com