

بکللام[®] ۵۰

Beclomethasone Dipropionate

بکلومتازون دی پروپیونات

ترکیبات: بکلومتازون دی پروپیونات ۵۰/۵ گرم در هر ۱۰۰ میلی لیتر

شکل دارویی: اسپری بینی

دسته دارویی: ضدالتهاب استروئیدی

موارد مصرف و آثار درمانی: درمان رینیت آلرژیک، پیشگیری از بازگشت پولیپ بینی (پس از عمل جراحی)

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمائید، قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت نمائید:

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو
- در صورت ابتلا به بیماری های کبدی، بیماری دیابت، آسم، هیپوتیروئیدیسم، جراحی بینی یا ضربه به بینی، هرگونه زخم جدید در بینی، سل فعال یا نهفته دستگاه تنفسی، سکنه قلبی اخیر، گلوکوم، عفونت های قارچی، باکتریایی و یا ویروسی، هپریس سیتهلیکس چشمی
- در صورت مصرف همزمان دارو از جمله ریفاکسیم، فنوباریتال، اقدرین

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی فقط با نظر و تجویز پزشک مصرف شود.

هشدارها:

• ایمنی و کارایی این دارو در کودکان کمتر از ۶ سال ثابت نشده است، لذا از مصرف آن در این گروه سنی خودداری شود. در صورت نیاز به مصرف طولانی مدت، حتماً به پزشک خود مراجعه نمائید. از انجام واکسیناسیون در طی مصرف دارو پرهیز نمائید. در صورت عدم بهبودی پس از ۳ هفته حتماً به پزشک خود مراجعه نمائید. در صورت پیدایش هرگونه عفونتی در بینی، گلو یا سینوس ها به پزشک خود مراجعه نمائید. در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یادآوردن آن را مصرف نمائید اما اگر زمان نوبت بعدی نزدیک بود آن را مصرف نکرده و از ۲ برابر کردن مقدار مصرف خودداری نمائید. یک ماه پس از باز شدن درپوش ظرف، باقیمانده دارو را دور بریزید. قبل از مصرف، ظرف حاوی دارو را به خوبی تکان دهید.

مقدار مصرف:

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند. اما به طور معمول مقدار مصرف این دارو بدین صورت می باشد:

بزرگسالان: هر ۱۲ ساعت ۱ تا ۲ پاف در هر سوراخ بینی.

کودکان بالای ۱۲ سال: هر ۱۲ ساعت ۱ تا ۲ پاف در هر سوراخ بینی.

کودکان ۶ تا ۱۲ سال: هر ۱۲ ساعت ۱ پاف در هر سوراخ بینی.

کودکان زیر ۶ سال: ایمنی و اثربخشی آن اثبات شده نیست.

نحوه مصرف:

ابتدا اسپری را به خوبی تکان دهید. انگشت شست خود را در زیر اسپری قرار دهید، نوک پمپ اسپری را به آرامی وارد سوراخ بینی کنید و سوراخ دیگر بینی را با انگشت فشار دهید. پمپ را فشار داده و این کار را برای سوراخ دیگر بینی تکرار نمائید. پس از مصرف، درپوش اسپری را روی آن قرار دهید.



عوارض جانبی:

این دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، گرچه همه این عوارض در یک فرد رخ نمی دهد اما در صورت بروز هر کدام از این عوارض با پزشک مشورت نمائید: زخم مخاط بینی، احساس خشکی بینی، احساس بوی بد در بینی، درد عضلانی، سر درد، خس خس ریه، التهاب چشم، صورت و یا لب ها، وزوز گوش.

مسمومیت دارویی:

در صورت مسمومیت فوراً بیمار را به بیمارستان مسمومین منتقل نمائید.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید.

دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمائید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها بکلومتازون را با نام تجاری بکللام[®] به شکل اسپری بینی و به صورت سوسپانسیون شیری رنگ با بوی گل رز در ظروف پلی اتیلنی ۲۰ میلی لیتری، درون جعبه و به همراه برگه راهنما عرضه می نماید.