



شرکت داروسازی ره‌سا
RAHA Pharmaceutical Co.

هشدارها:

- اطمینان از عدم ابتلا به گلوکوم، فشار خون بالا، زخم پپتیک، احتباس ادراری و حامله بودن بیمار قبل از شروع درمان
- کاهش دوز دارو در صورت استفاده به عنوان داروی کمکی قبل و بعد از جراحی
- افزایش مصرف مایعات و اجتناب از مصرف شیر در صورت غلیظ شدن ترشحات برونشی
- دارو را بیش از مقدار تعیین شده مصرف نکنید.
- این دارو حاوی کمتر از ۳ میلی گرم سدیم در هر میلی لیتر می باشد.
- در نوزادان نارس و تازه متولد شده توصیه نمی شود.

عوارض جانبی:

- هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود؛ اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:
- عوارض شایع: دپرسیون مغزی به شکل خواب آلودگی، سر درد، احتباس ادراری و یبوست
 - سایر عوارض جانبی: امکان ایجاد حساسیت و خارش در محل تزریق، هیپوتانسیون زود گذر، تحریکات مغزی، عوارض خونی مانند آگرانولوسیتونی، ترومبوسیتونی، آنمی آپلاستیک، امکان تاثیر بر حس چشایی و بویایی

شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها کلرفنیرامین مالئات را به شکل آمپول استریل یک میلی لیتری و درون جعبه عرضه می نماید.

AMP.LFT.CPH1/005.09

اصفهان - کیلوتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه - واحد ۱۱ صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵ تلفن: ۳۶۵۴-۳۱(+۹۸)
www.rahapharm.com فکس: ۹۵۹-۳۶۵۴(+۹۸) ۸۵۹-۳۶۵۴(+۹۸)

(P.2)



شرکت داروسازی ره‌سا
RAHA Pharmaceutical Co.

Chlorpheniramine 10 mg/ml

کلرفنیرامین ۱۰ میلی گرم در میلی لیتر

شکل دارویی: آمپول تزریقی ۱ میلی لیتری
دسته دارویی: آنتی هیستامین
ترکیبات: کلرفنیرامین مالئات ۱۰ میلی گرم در میلی لیتر

موارد مصرف:

درمان علائم آلرژیک شامل کهیسر، آنژیوادم، رینیت، کنژکتیویت، بیماریهای پوستی خارش دار. گاهی در درمان سرفه و سرماخوردگی های معمولی نیز بکار می رود.

راهنمایی‌های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:
- در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو از جمله آنتی هیستامین ها
 - در صورت مصرف هرگونه دارو از جمله داروهای سرکوب کننده CNS شامل الکل، باریتورات ها، ضد دردهای مخدر، خواب آورها، ضد اضطراب های سداتیو و ضد سایکوزها

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف دارو در دوران بارداری در صورت نیاز قطعی و ارجحیت منافع بر عوارض بالقوه بر جنین تجویز می گردد. منع مصرف در سه ماهه سوم بارداری و دوران شیردهی وجود دارد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- مقدار مصرف توسط پزشک و بر اساس شرایط بیمار تعیین می گردد اما بطور معمول میزان مصرف این دارو بدین صورت می باشد:
- **بزرگسالان:** ۱۰ میلی گرم و در صورت نیاز تکرار تا حداکثر ۴۰ میلی گرم در روز
 - **سنتین ۱ تا ۱۸ سال:** در این سنتین دوز دارو بر اساس سن و وزن بیمار محاسبه می گردد و معادل ۰.۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد.

حداکثر دوز مجاز روزانه در افراد ۱۲ سال به بالا معادل ۴۰ میلی گرم، کودکان ۶ تا ۱۱ سال معادل ۲۰ میلی گرم و کودکان ۱ تا ۶ سال معادل ۱۰ میلی گرم در روز می باشد.
نحوه مصرف دارو به صورت تزریق عضلانی، زیر جلدی یا داخل وریدی آهسته (طی مدت ۱ دقیقه) می باشد.

اصفهان - کیلوتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه - واحد ۱۱ صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵ تلفن: ۳۶۵۴-۳۱(+۹۸)
www.rahapharm.com فکس: ۹۵۹-۳۶۵۴(+۹۸) ۸۵۹-۳۶۵۴(+۹۸)

(P.1)