

- \* اتروفی عضلات ، میوپاتی پروگریمال ، بسته شدن زود هنگام ابی فیز ، پوکی استخوان ، نکروز عروق استخوان ها ، ضعف عضله ، پارگی تاندون ، فقره سازی مهده های ستون فرات ، نکستگی استخوان های بلند .
- \* دیس پیسی ، خونریزی و ایجاد پرور اسیون گوارشی ، رخم ازو فژازیال ، التهاب پانکراس حاد و کاندیدیازیس .
- \* اختلال در بهبود زخم ، اتروفی پوست ، کبودی ، تلائز کتاری و استریا ، پتشی و خون مردگی ، قرمی ، افزایش تعریق ، سوزش ، آکنه ، درماتیت البریز .
- \* افزایش شمار چشم ، کاتاراکت ، اسباب به اصحاب بینایی ، التهاب و بیرون زنگی مردمک چشم ، کاهش ضخامت قرنیه ، افزایش احتمال عفونت های قارچ و ویروسی چشم .
- \* سر درد ، سرگیجه ، افزایش فشار داخل جمجمه به همراه پایپلولادما در کودکان .
- \* اتروفی شبکه کارکوت ، لوکوسیتوز ، ترزو میو امبویولی .
- \* احتمال ایجاد کمری در بی تزریق داخل ضایعه در نوایی صورت و گردن .

#### موارد منع مصرف دارو:

- در صورتی که مصرف این دارو برای بیمار حیاتی نباشد ، در موارد زیر نباید مصرف گردد :
- \* عفونت بینیتیک (مگر اینکه تحت درمان باشد).
- \* حساسیت به دارو یا هر یک از اجزاء آن .

#### مقدار و نحوه مصرف :

- \* مقدار و نحوه مصرف این دارو توسط پزشک تعیین می شود .
- \* دگرمتازون به صورت عضلانی ، وریدی ، داخل مفصل و داخل بافت نرم قابل تزریق است. تزریق داخل وریدی می تواند به صورت مستقیم (بیش از یک دقیقه) یا به صورت انفوژیون در سرم های سدیم کلراید و دکستروز انجام گردد .

#### شرایط نگهداری :

- \* دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از بیخ زنگی محافظت نمایید .
- \* دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید .

#### بسته بندی :

- شرکت داروسازی رها دگرمتازون را به صورت آمپول های ۲ میلی لیتری ، به همراه برگ راهنمای درون جعبه ، بسته بندی و به بازار عرضه می نماید هر ۲ میلی لیتر آمپول محتوی ۸ میلی گرم دگرمتازون سففات (به صورت دی سدیم ) می باشد .

## Dexamethasone

### دگرمتازون

**شكل دارویی:** آمپول ۸ میلی گرم در ۲ میلی لیتر  
**دسته دارویی:** گلوبکورتیکوئید

**موارد مصرف:** ادم ، حساسیت ، بیماری های کلارن ، بیماری های پوستی التهابی ، بیماری های خونی ، بیماری های نوپلاستیک و بیماری های التهابی چشمی و تنفسی .

#### راهنمایی های عمومی:

- \* قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پیش خود مشورت کنید .
- \* در صورت سایده حساسیت به کورتیکو استرتوئیدها و یا داروهای دیگر و یا غذاها ، مواد محافظ ، رنگها ... .
- \* در صورت ایتلای به بیماری هایی نظیر حساسیت ، دیابت ، بیماری های گوارشی و سابقه خونریزی ستگاه گوارش .
- \* در صورت مصرف همزمان هر داروی دیگر همراه با این دارو .

#### صرف در دوران بارداری و شیردهی:

با توجه به عبور دارو از جفت و همچنین ترشح آن در شیر مادران شیرده و با احتمال اثر کاهنده بر روی سیستم رشد جنین و نوزاد ، مصرف در دوران بارداری و شیردهی با رعایت نکات اینین برای مادر و جنین و نظرارت پزشک معالج مجاز می باشد .

#### تدخالت دارویی:

- \* داروهای رفامپیسین ، ریفابوتین ، افرینین ، کاربامازین ، فنیل بوتاژون ، فنیل بوتاربیتال ، فنی توینین ، پرمیدون ، آمینوگلورتیتیمید متاولیسم کیدی کورتیکو استرتوئیدها را افزایش می دهد .
- \* دگرمتازون الکانکنده ی انزیم CyP3A4 می باشد و متاولیسم داروهایی مانند ایندینوبیوراپتیو و ملیسین را کاهش می دهد .
- \* اثر درمانی داروهای کاهنده قند خون ، کاهنده فشار خون ، گلیکوژندهای قلبی و دیورتیک ها ، توسعه کورتیکو استرتوئیدها کاهش می باشد و همچنین اثرهای ناپذیر از عالم روانی ، مشکل در خواب ، فراموشی (این عالم ممکن است با عالم قطعه مصرف نیز همراه شود) .
- \* سرکوب محور هیپوتالاموس - هیپوفیز - ادرنال به سویت و اسنته به دوز ، قدرت و مدت زمان مصرف .
- \* زخمگارشی و بروتکوپلیسم هستی در دوز های کم دارو و در معرفت و اسنته به دوز ، قدرت و مدت زمان مصرف .
- \* واکنش های حساسیتی مانند انافیلاکسی ، کاهش و افزایش پیگمنت ها .
- \* سندرم کوشینگ ، هیرسوتیسم و افزایش وزن ، سرکوب رشد در نوزادان ، کودکان و نوجوانان ، به هم ریختگی دوران قاعدگی و آمنوره ، عدم تحمل گلگز ، افزایش قند خون ، ایجاد تعادل منفی پروتئین / اینتربون و کلسیم ، افزایش اشتها .
- \* به هم ریختگی تعادل الکتروولیت ، کاهش ذایای نیتروژن ، الکالو هایلیپو کالمیک ، افزایش دفع کلسیم و پتانسیم و افزایش فشار خون .
- \* سرکوب سیستم اینین

#### عارض جانبی:

- \* هر دارو به مواز اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود ، اگرچه تمام عوارض ذکر شده لزوماً فرد مشاهده نمی شود ، اما در صورت بروز هر عارضه با پیش خود مشورت نمائید .
- \* طف و سبیعی از عالم روانی : تحریک پیغیری ، توه ، افسرگی ، افکار خودگذشتی ، علامت جنون مانند مانیا ، هذیان و اسکیزوفرنی ، اختلال رفتاری ، اضطرابی ، اختلال شناختی ، مشکل در خواب ، فراموشی (این عالم ممکن است با عالم قطعه مصرف نیز همراه شود) .
- \* سرکوب محور هیپوتالاموس - هیپوفیز - ادرنال به سویت و اسنته به دوز ، قدرت و مدت زمان مصرف .
- \* زخمگارشی و بروتکوپلیسم هستی در دوز های کم دارو و در معرفت و اسنته به دوز ، قدرت و مدت زمان مصرف .
- \* واکنش های حساسیتی مانند انافیلاکسی ، کاهش و افزایش پیگمنت ها .
- \* سندرم کوشینگ ، هیرسوتیسم و افزایش وزن ، سرکوب رشد در نوزادان ، کودکان و نوجوانان ، به هم ریختگی دوران قاعدگی و آمنوره ، عدم تحمل گلگز ، افزایش قند خون ، ایجاد تعادل منفی پروتئین / اینتربون و کلسیم ، افزایش اشتها .
- \* به هم ریختگی تعادل الکتروولیت ، کاهش ذایای نیتروژن ، الکالو هایلیپو کالمیک ، افزایش دفع کلسیم و پتانسیم و افزایش اشتها .
- \* سرکوب سیستم اینین