

Diprocol®

Clotrimazole / Betamethasone

دیپروکل®

کلوتریمازول / بتامتازون

شکل دارویی: کرم موضعی

دسته دارویی: ضد قارچ / ضد التهاب کورتیکواستروئیدی

اثر درمانی: درمان عفونتهای قارچی پوستی تمام با التهاب، قرمزی و خارش، تینا کروئیس (خارش ژوک)، تینا کورپوریس، تینا پدیس (قارچ پای ورزشکاران).

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنماییهای عمومی:

❖ قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- ۱- در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده رنگی یا ماده محافظ یا هر یک از ترکیبات آزلول و کورتیکواستروئیدها.
- ۲- در صورت بارداری و شیردهی.
- ۳- در صورت مصرف داروهای ضد قارچ دیگر از جمله مایکونازول، تیوکنازول، فلوکانازول، ایتراکونازول و یا آمفوتریسین بی، ضد دیابتها، انسولین، آنتی اسیدها، سیکلوسپورین، دیگوکسین، مکملهای پتاسیم، ریتودرین، داروهای حاوی سدیم، سوماتروپین.
- ۴- در صورت ابتلا به عفونتهای قارچی، ایدز، بیماریهای قلبی، دیابت، ازوفازیت، گاستریت، سایکوز، نارسایی کلیوی، سل، بیماریهای ویروسی حاد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

تجویز دارو در دوران بارداری و بخصوص سه ماهه اول بارداری و شیردهی با نظر پزشک صورت گیرد. مصرف در دوران بارداری بخصوص به صورت وسیع برای مدت طولانی توصیه نمیشود.

تجویز دارو در دوران شیردهی ممکن است، به دلیل جذب پوستی، باعث مهار رشد نوزاد گردد.

هشدارها:

- ۱- مصرف مداوم طولانی مدت یا تا به جای استروئیدهای موضعی می تواند منجر به بروز التهاب عود کننده پس از توقف درمان شود (سندروم قطع مصرف استروئید موضعی). یک فرم از التهاب عودکننده می تواند به صورت درمانیت همراه با قرمزی شدید، درد و سوزش بروز پیدا کند که تا اطراف محل اولیه ی درمان گسترش یابد. این واکنش زمانی که استروئید موضعی در نواحی دارای پوست حساس و نازک مثل صورت و نواحی چین دار مصرف شود، بیشتر احتمال دارد رخ دهد. تکرار این شرایط به صورت واکنش پس از قطع مصرف دارو، طی روزها تا هفته های پس از درمان موفقیت آمیز باید در نظر گرفته شود. در این موارد توصیه می شود استعمال مجدد استروئیدهای موضعی همراه با احتیاط و به توصیه ی پزشک انجام شود و یا داروی دیگری جایگزین گردد.
- ۲ - در صورت حساسیت و یا تحریک موضع، مصرف دارو را قطع کرده و درمان دیگری را شروع کنید.
- ۳ - قبل از استفاده از دارو موضع مصرف را تمیز و خشک نمایید.
- ۴ - دارو را به صورت لایه نازک و کامل بر روی سطح آسیب دیده به آهستگی قرار دهید.
- ۵ - دوره درمان را کامل کنید. در صورت مشاهده بهبودی ظاهری پس از چند روز مصرف درمان را قطع نکنید و تا تمام شدن دارو درمان را ادامه دهید.

(P.1)

- ۶ - در صورت عدم بهبود و ادامه تحریک و خارش مصرف دارو را قطع کنید و به پزشک اطلاع دهید.
- ۷ - در صورت عدم بهبود بعد از ۳ روز و تداوم علائم بیماری در مدت ۷ روز و یا عود مجدد علائم پس از ۲ ماه از مصرف دارو به پزشک اطلاع دهید.
- ۸ - از تماس دارو با اطراف چشم پیشگیری نمایید.
- ۹ - در موضع قرار گرفتن دارو، از پوشیدن لباس تنگ و در مورد نوزادان از بستن پوشک های سفت و پلاستیکی خودداری نمایید.
- ۱۰ - این دارو فقط برای استعمال خارجی می باشد.
- ۱۱ - پس از استفاده از دارو دستهای خود را با آب بشویید مگر اینکه برای درمان دست استفاده شده باشد.
- ۱۲ - در کودکان باعث ساپرس HPA و بروز سندرم کوشینگ و مهار رشد به دلیل جذب پوست میشود.
- ۱۳ - در صورت ابتلا به عفونت قارچ در پا، از صندل یا کش های رو باز استفاده کنید و از پودرهای جاذب مثل پودر بچه نیز میتوانید بعد از کرم استفاده نمایید.
- ۱۴ - در افراد مبتلا به دیابت، بتامتازون با جذب پوستی میتواند به ندرت باعث افزایش قندخون و ادرار شود، به خصوص با مصرف بی رویه و خودسرانه دارو، در این صورت قبل از تغییر داروهای دیابتی خود حتما با پزشک مشورت نمایید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

در عفونتهای قارچی بالغین و کودکان بالای ۱۲ سال:

تینا کروئیس و تینا کورپوریس: به صورت موضعی ۲ بار در روز (صبح و عصر) به مدت ۲ هفته

تینا پدیس: به صورت موضعی ۲ بار در روز (صبح و عصر) به مدت ۴ هفته

کودکان زیر ۱۲ سال: مصرف نگردد.

دوره درمان را کامل کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هر یک از عوارض ذیل با پزشک مشورت نمائید:

عوارض (نادر): اریتم، سوزش، خارش، کهیر، ادم و سایر تحریکاتی که قبل از درمان وجود نداشته است.

سایر عوارض جانبی به مرور زمان و با سازگاری بدن با دارو رفع می شوند در صورت ادامه عوارض با پزشک تماس بگیرید.

مسمومیت دارویی:

در صورت بروز مسمومیت (نادر) سریعاً بیمار را به بخش مسمومین منتقل کنید.

شرایط نگهداری دارو:

❖ دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید و از یخ زدگی محافظت نمائید.

❖ دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها ترکیب کلوتریمازول و بتامتازون را به شکل کرم موضعی در تیوبهای ۳۰ گرمی تهیه و در جعبه به همراه بروشور عرضه میکند.

هر ۱۰۰ گرم کرم موضعی حاوی ۱ گرم کلوتریمازول و ۰/۰۵ گرم بتامتازون (بصورت دی پروپیونات) میباشد.

(P.2)