

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است در بعضی افراد موجب بروز برخی عوارض آنخواسته گردد.

گرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمیشوند، ولی در صورت بروز هر یک از آنها بهتر است با پوشش مشورت شود:

- احساس ناراحتی در چشم، سوزش، تاری دید، تشکیل رسموب روی پلکهایا و مژه‌ها
 - **وش منصرف:** سر را به طرف عقب بگیرید، سپس با یک دست پلک پایینی را به طرف پایین کشیده و در حالیکه به بالا نماید میکنید با دست دیگر قطره را به داخل پلک چشم بچکانید. سپس چشم را به اطراف گردانید تا قطره در تمام سطح چشم پراکند شود.
 - چشم را به آرامی بیندید و به مدت ۳ تا ۵ دقیقه به کمک انتگلشت سست گوشه چشم (سمت پایینی) را به آرامی فشار دهد. چشم را بسته نگهداشته و در این فرصت داروی اضافی خارج شده ز جم را با استعمال تمیز پاک کنید.
 - از تعاس نوک قظره چکان با محل و آلوگی آن خودداری کنید. از ریختن قطره بطور مستقیم روی مردمک و قرنیه خودداری کنید.



شرایط نگهداری:

- فرآورده را دور از نور و رطوبت و در مای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهاداری و از بین زدگی محافظت نمائید.
 - دور از دید و دسترسی کوکد قرار دهد.
 - یکماه پس از باز کردن درپوش طرف با قیمانده را دور برپزید و از مصرف آن خودداری کنید.

مسئلۀ بند:

بسته‌بندی:

مشترک داروسازی رها قطره استریل اشک مصنوعی را با نام تجاری آیاوت[®] تولید نموده و در طرف پای اتیلنی سفید ۱۰ میلی لیتری و درون جعبه به همراه برگه راهنمای بسته بندی و به بازار عرضه می‌کند.

Eyeawet®

Artificial Tears

ترکیبات: هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (۳/۰ درصد) - دکستران ۷۰ (۱/۰ درصد)

شكل محصول: قطره استريل چشمی

موارد مصرف:

درمان کمبود ترشح اشک در موارد خشکی چشم ، تحریک چشمی ناشی از کمبود اشک ، التهاب خشک قرنیه و ملتجمه و مرطوب نگهدارشتن قرنیه در بیمارانی که به هر علت قادر به بستن پاک نسیند.

راهنمایی‌های عمومی:

- در صورت حساسیت به فرآورده ها بر یک از اجزای تشکیل دهنده فرآورده، قبل از مصرف با پوشک خود مشورت کنید.
 - دوره درمان را کامل نموده و فرآورده را بیش از مقدار توصیه شده توسعه پوشک مصرف نکنید.
 - در صورت استفاده از لزهای تعاضی از مصرف فرآورده با پوشک مشورت کنید. بهتر است در زمان مصرف آن به علت احتمال بروز عفونت از لزهای تعاضی استفاده نکنید.

صرف در دوران بارداری و شیردهی :

مصرف فرآورده در دوران بارداری و شیردهی بالمانع است. (گروه A)
هشدارها و موارد منع مصرف:

- در صورت روز سر درد، چشم درد، تغییرات پیشانی، تداوم قرمزی یا بادتر شدن و تداوم وضعیت برای بیشتر از ۳ روز، مصرف فراورده قطعه گردید.
 - در مصرف هم زمانی این فراورده با محلولهای شستشو دهنده بورات، امکان ایجاد رسوبات چسبنای روی پلکانها وجود دارد.
 - در صورت استفاده از نر تماشی نرم می باشد قبل از مصرف فراورده لز نر را از چشم خارج نموده و دقیقه بعد از مصرف دارو آن را در چشم قرار دهد.
 - در صورت نیاز به استفاده از داروهای چشمی دیگر، باید حداقل ۱۰ دقیقه فاصله بین زمان مصرف آن ها وجود داشته باشد.

مقدار مصرف:

۱-۲ قطره ۳-۴ بار در روز و در صورت نیاز مقدار بیشتر در هر چشم چکانده شود.