

Ketrofal® 0.5% Ketorolac

کتروفال® ۰/۵ درصد
کتورولاک

ترکیبات: کتورولاک ترومتامین

شکل دارویی: قطره استریل چشمی ۰/۵ درصد

دسته دارویی: ضد التهاب غیر استروئیدی

موارد مصرف:

ورم ملتهمة، آلرژی، خارش در اثر آلرژی فصلی، پیشگیری و درمان التهاب و تورم چشم پس از جراحی کاتاراکت (آب مروارید).

راهنمایهای عمومی:

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

۱- در صورت سابقه حساسیت به آسپرین، مشتقات فنیل استیک اسید مانند دیکلوفناک یا دیگر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs).

۲- در صورت مصرف داروهای آنتی کوآگولانت ها، آسپرین یا هپارین و پروپنسید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیر دهی بایستی در موارد اضطراری و با تشخیص پزشک انجام شود

(گروه C)

هشدارها:

۱- این دارو را بیش از مقدار توصیه شده مصرف ننمایید. دومین قطره در صورت لزوم داخل چشم چکانده شود.

۲- هنگام مصرف از تماس نوک قطره چکان با چشم یا هر سطح دیگر خودداری نمایید

۳- در صورتی که یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید.

ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از مصرف آن خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.

۴- از مصرف همزمان با لنزهای تماسی نرم خودداری گردد.

۵- این دارو به علت احتمال ایجاد عارضه در قرنیه بهتر است در بیمارانی که مشکل قرنیه و یا جراحی قرنیه داشته یا مبتلا به دیابت یا آرتریت روماتوئید هستند با احتیاط مصرف شود.

۶- مصرف همزمان با استروئیدها ممکن است زمان بهبود زخم و احتمال آسیب های باقی را افزایش دهد.

مقدار مصرف:

مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند. ولی مقدار مصرف معمولی این دارو به شرح زیر است:

== ورم ملتهمة و آلرژی : ۱ قطره در هر چشم ۴ بار در روز

== التهاب: ۱ قطره در چشم آسیب دیده ۴ بار در روز (مصرف دارو ۲۴ ساعت بعد از جراحی کاتاراکت شروع شده و تا ۲ هفته ادامه یابد).

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند در صورت بروز هر یک از عوارض زیر سریع با پزشک خود تماس بگیرید:

عارضه شایع:

سوزش و التهاب چشم، کراتیت سطحی، احتقان و قرمزی، عفونت، ادم پلک، خونریزی چشم، افزایش فشار داخل چشم، تاری دید، ادم ماکولار کیستی

عوارض با شیوع کمتر: افزایش حساسیت، التهاب و آسیب قرنیه، قرمزی، تحریک چشم و خشکی چشم

نحوه مصرف:

برای مصرف دارو سر را قدری به سمت عقب خم کنید. پلک پایین را با انگشت گرفته و مقداری به سمت جلو بکشید (شکل ۱). یک قطره از محلول را در حفره پلک پایین بچکانید (شکل ۲). در حالی که سمت پایین را نگاه می کنید چشم را به آرامی ببندید (شکل ۳). به مدت ۵-۳ دقیقه گوشه چشم خود را به کمک انگشت شست به سمت بینی فشار دهید. چشم را بسته نگه دارید و داروی اضافی خارج شده را با دستمال تمیز پاک کنید (شکل ۴).

از تماس نوک قطره چکان با چشم یا هر سطح دیگری خودداری کنید. در صورت استفاده از لنز تماسی نرم قبل از مصرف دارو لنز را از چشم خود خارج نموده و ۱۵ دقیقه بعد از مصرف دارو مجدداً آن را در چشم قرار دهید. در صورت نیاز به استفاده از داروهای چشمی دیگر بین مصرف آن ها با این دارو ۱۰ دقیقه فاصله دهید. در صورت فراموشی استفاده از یکی از نوبت ها، دارو را به محض یادآوری مصرف کنید، ولی از دو برابر کردن مقدار مصرفی خودداری ننمایید.



شکل (۱)



شکل (۲)



شکل (۳)



شکل (۴)

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایند.

۳۰ روز پس از باز کردن دربوش ظرف، باقیمانده دارو را دور بریزید. پس از هر بار مصرف دربوش ظرف را محکم ببندید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها قطره کتورولاک ۰/۵ درصد را با نام تجاری کتروفال® به شکل قطره استریل چشمی تولید نموده و در ظروف پلی اتیلنی سفید و درون جعبه به همراه برگه راهنما بسته بندی و به بازار عرضه میکند.