





قبل از مصرف دارو بینی باید تمیز باشد. هنگام استفاده از دارو، از طریق بینی نفس بکشید و دارو را هنگام دم اسپری کنید. به منظور استفاده صحیح از اسپری ابتدا بطری را ۵ ثانیه تکان داده و سپس درپوش سر اسپری را بردارید.

اسپری را در دست گرفته و سر را کمی به جلو خم نمایید و سر اسپری را داخل یکی از سوراخ های بینی قرار دهید، سپس با دست سوراخ دیگر بینی را مسدود نمایید.



همراه دم، اسپری را تا انتها فشار دهید، سپس این عمل را برای سوراخ دیگر بینی تکرار نمایید.



قطعه سر اسپری را با آب گرم تمیز نموده و سپس سربوش اسپری را در جای خود قرار دهید.

(۴) (۵)

ث (عوارض جانبی):

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند.

شایع ترین عوارض شامل: تحریک گلو و نای، خس خس سینه، سرفه، عطسه، آبریزش

سایر عوارض: راش و کهیر، سردرد، مزه بد دهان

عوارض نادر: پنومونی آئوزینوفیلی

❖ عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند:

شوگ آنافیلاکسی (سرفه، مشکل در بلع، کهیر، خارش پوست، تورم صورت، لبها و پلک، خس خس سینه، مشکل در تنفس)، خونریزی بینی، راش پوستی

ج (شرایط نگهداری دارو):

دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

چ (بسته بندی):

شرکت داروسازی رها کرومولین سدیم را با نام تجاری مولینوز® به شکل اسپری بینی در ظروف پلی اتیلنی ۲۰ میلی لیتری، درون جعبه و به همراه بروشور بسته بندی و به بازار عرضه می نماید.

❖ هر پاف حاوی ۲ میلی گرم ماده موثره است.

Molinose® Cromolyn Sodium

مولینوز® کرومولین سدیم

شکل دارویی: اسپری بینی ۲۰ میلی لیتری

دسته دارویی: تثبیت کننده ماست سل، آنتی آلرژیک

موارد مصرف و آثار درمانی: درمان و پیشگیری از رینیت آلرژیک دائمی یا فصلی

الف) راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

❖ در صورت حساسیت به دارو یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده ی دارو.

ب) مصرف در دوران بارداری و شیر دهی:

مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط تجویز گردد (گروه B).

پ) هشدارها:

۱- در حین مصرف نوک اسپری با مخاط بینی تماس نداشته باشد.

۲- هرگز مصرف اسپری خود را به دیگران توصیه نکنید زیرا سبب انتشار عفونت میشود.

۳- پس از استفاده سر اسپری را با آب گرم بشوئید یا پارچه تمیز خشک کنید.

۴- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن، در صورتیکه نزدیک مصرف دوز بعدی نباشد، از اسپری استفاده کنید و از دو برابر کردن مقدار مصرف خودداری کنید.

۵- دارو را بیش از مقدار توصیه شده مصرف ننمایید.

۶- این دارو در کودکان کمتر از ۶ سال توصیه نمی شود.

۷- اثرات درمانی این دارو ممکن است تا ۲ الی ۴ هفته پس از شروع درمان ظاهر نشود.

ت) مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند با این وجود مقدار مصرف معمول دارو به صورت زیر می باشد:

❖ پیشگیری از رینیت آلرژیک:

■ بزرگسالان

۱ پاف ۴-۶ بار در روز در هر ۲ سوراخ بینی، به مدت ۳-۲ هفته قبل از قرار گرفتن در معرض آلرژن ها و ادامه درمان در مدت مواجهه با آلرژن ها

■ کودکان شش سال و بالاتر: همانند بزرگسالان

■ کودکان کمتر از ۶ سال: مصرف این دارو توصیه نمی گردد.