

Oxynose®

Oxymetazoline HCl

اکسی نوز®

اکسی متازولین هیدروکلراید

ترکیبات: هر ۱۰۰ میلی لیتر حاوی ۰/۰۵ گرم اکسی متازولین هیدروکلراید

شکل دارویی: اسپری بینی ۰/۰۵ درصد

دسته دارویی: ضد احتقان بینی (nasal decongestant)

آثار درمانی:

درمان گرفتگی بینی ناشی از سرما خوردگی، آلرژی و سینوزیت، آنفلوآنزا و تب یونجه، کاهش احتقان و فشار در سینوس ها.

راهنمایی‌های عمومی:

شروع اثر این دارو چند دقیقه و طول اثر آن ۱۲ ساعت می باشد.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه آلرژی یا سابقه حساسیت به اکسی متازولین و بنزالکونیوم کلراید.
- در صورت ابتلا به بیماریهای قلبی، فشار خون، دیابت، پروستات، گلوکوم با زاویه بسته، هیپرتیروئیدسم، رینیت.
- در صورت مصرف داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای، مهار کننده های مونوآمین اکسیداز (حتی تا دو هفته قبل) و ماپروتیلین.
- در صورت سابقه جراحی بینی.

مصرف در دوران بارداری و شیر دهی:

دردوران بارداری و شیر دهی فقط با نظر و تجویز پزشک مصرف گردد.

هشدارها:

- ایمنی و کارائی داروی اکسی متازولین در کودکان زیر ۶ سال ثابت نشده است، لذا از مصرف آن در این گروه سنی خودداری نمایید.
- در صورت عدم بهبودی پس از ۷ روز، حتما به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت تداوم احساس سوزش، خشکی یا افزایش ترشحات بینی، حتما با پزشک معالج خود مشورت نمایید.
- در صورت ابتلا به پورفیریا (porphyria) یا سابقه ابتلاء به آن از مصرف این دارو اجتناب نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود؛ گرچه همه این عوارض در یک فرد رخ نمی دهد،

ولی در صورت بروز به پزشک اطلاع دهید.

در صورت تنگی نفس یا سختی و دشواری در بلع، ادم صورت، لبها و گلو، خارش شدید پوست همراه با قرمزی و براقوختگی گونه ها، استفاده از

اکسی متازولین را متوقف نمایید و با پزشک معالج خود سریعاً تماس حاصل نمایید.

- عوارض جانبی شایع: خشکی یا خارش مخاط بینی، تهوع، سردرد و سرگیجه.
- عوارض جانبی نادر: واکنش های آلرژیک پوستی یا خارش، دوبینی و تاری دید، تپش قلب.

مقدار مصرف:

بزرگسالان و کودکان بالای ۶ سال: ۲ تا ۳ پاف در هر سوراخ بینی، هر ۱۲ ساعت.


کودکان زیر ۶ سال: مصرف آن توصیه نمی گردد.

نحوه مصرف:

ابتدا اسپری را به خوبی تکان دهید. انگشت شست خود را در زیر اسپری قرار دهید، نوک پمپ اسپری را به آرامی وارد سوراخ بینی کنید و

سوراخ دیگر بینی را با انگشت فشار دهید. پمپ را فشار داده و این کار را برای سوراخ دیگر بینی تکرار نمایید. پس از مصرف، درپوش

اسپری را روی آن قرار دهید.



مسمومیت دارویی:

مصرف بیش از حد مجاز این دارو خصوصاً در کودکان بر روی سیستم اعصاب مرکزی تاثیر می گذارد؛ لذا فوراً بیمار را به بیمارستان مسمومین منتقل نمایید.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

۲۰ روز پس از باز شدن درپوش ظرف، باقیمانده دارو را دور بریزید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رهسا اکسی متازولین هیدروکلراید را با نام تجاری اکسی نوز® به صورت محلول شفاف و به شکل اسپری بینی ۱۵ میلی لیتری در جعبه

مقوایی به همراه برگه راهنما عرضه می نماید.