



شرکت داروسازی رها
RAHAPHARMA.CO.



PROFUM® Bisoprolol

پروفام® بیزوپرولول

ترکیبات : بیزوپرولول فومارات

شکل دارویی: قرص روکشدار خط دار ۲/۵ و ۵ و ۱۰ میلی گرم

دسته درمانی: کاهنده فشار خون (مهار کننده انتخابی گیرنده بتا - ۱)

موارد مصرف و آثار درمانی:

- درمان فشار خون بالا به تنهایی و یا همراه با سایر داروهای کاهنده فشار خون
- درمان بیماری عروق کرونری (آتروین صدی)
- نارسائی احتقانی مزمن قلب (CHF)

راهنمایی های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمائید.
- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت نمائید:

۱- در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا سایر داروهای بتابلاکر (از جمله: آتنولول، لابتالول، کارودیلول، سوتالول، پروپرانولول، نادولول)

۲- مصرف سایر داروها (حتی داروهای گیاهی) به خصوص داروهای سرماخوردگی و داروهای ضد احتقان بینی

۳- سابقه حساسیت دارویی یا هرگونه سابقه حساسیتی شدید

• رعایت رژیم غذایی توصیه شده توسط پزشک، بسیار حائز اهمیت می باشد.

• در طول مصرف دارو به طور منظم به پزشک مراجعه نمایید.

• بدون نظر پزشک متخصص مصرف دارو را قطع ننمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در رده C بارداری از طبقه بندی FDA قرار دارد و در دوران بارداری باید با احتیاط فراوان و تنها در صورت صلاحدید و تجویز پزشک متخصص مصرف گردد. اطلاعات کاملی در خصوص ترشح شدن این دارو در شیر وجود ندارد لذا مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

هشدارها:

در موارد زیر مصرف این دارو با احتیاط و زیر نظر پزشک متخصص صورت پذیرد: • بیماران مبتلا به دیابت شیرین با نوسان سطح قند خون (داروهای بتابلاکر ممکن است علائم هیپوگلیسمی را پنهان نمایند) • مواقع روزه داری و گرسنگی شدید • بیماران مبتلا به بلوک درجه یک گره AV (دهلیزی-بطنی) • آتروین پرینزمتال • بیماران دچار انسداد عروق محیطی بویژه در ابتدای درمان • افراد دچار پُورپورایس یا سابقه پُورپورایس • بیماران با کلیترانس کراتینین کمتر از ۴۰ ml/min و یا ابتلاء به سیروز (در این بیماران نیمه عمر دارو افزایش می یابد) • بیماران مبتلا به برونکواسپاسم (آسم، انسداد راه های هوایی) • قبل از بیهوشی عمومی • بیماران مبتلا به فئوکروموسیتوما

موارد منع مصرف:

• بیماریانی که به تازگی دچار نارسایی قلبی حاد شده اند یا در دوران نقاهت به سر می برند و نیاز به درمان تزریقی وریدی یا داروهای افزایشنده قدرت انقباض قلب دارند • بیماریانی که به دلیل نارسایی قلبی دچار شوک شده اند (شوک کاردیوژنیک) • بیماریانی که دچار آشفتهگی شدید هدایت دهلیزی بطنی بدون ضربان ساز شده اند (بلوک AV درجه ۲ یا ۳) • بیماران دچار سندروم سینوس بیمار (Sick sinus syndrome) • بیماران مبتلا به بلوک گره سینوسی دهلیزی (sinoatrial node block) • بیماریانی که ضربان قلبی پایینی دارند (برادی کاردی) • بیماریانی که فشار خون پایینی دارند (symptomatic hypotension)

www.rahapharm.com

TAB.LFT.PRF10/083.01

مصدوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵
فکس: ۰۹۵۹-۳۶۵۴۰۳۱-۳۱(+۹۸)

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی سفه ، واحد ۱
تلفن: ۰۶۵۹-۳۶۵۴۰۳۱-۳۱(+۹۸) فکس: ۰۸۵۹-۳۶۵۴۰۳۱-۳۱(+۹۸)



شرکت داروسازی رها
RAHAPHARMA.CO.



• افراد مبتلا به بیماری های شدید انسداد عروق محیطی یا سندروم رینود (raynaud's syndrome) • بیماران با اسیدوز متابولیک • افراد دارای حساسیت به بیزوپرولول و یا سایر داروهای بتابلاکر • در هیپوکالمی (کمتر از ۴ mEq / L)

تداخلات دارویی: در صورت مصرف هر یک از داروهای زیر با پزشک متخصص مشورت نمائید:

داروهای ضد آریتمی کلاس I (کینیدین، دیژوپرامید، لیدوکائین، فنی توئین، فلکانید، پروپافنون)، نیفدپین، وراپامیل، دیلتیازم، کلونیدین، متیل دوپا، موکسونیدین، ریلمتیدین، آمبودارون، اتسولین، داروهای ضد دیابت، دیگوکسین، ایزوپرنالین، دوبوتامین، نورآدرنالین و آدرنالین، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای، باربیتورات ها، فنوتیازین ها، مفلوکین، مهارکننده های منوآمین اکسیداز (فلزین، ترانیل سیپرومین، سلنیلین)، سایمیتیدین، داروهای ضد بارداری خوراکی، دیفن هیدرامین، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، سیپروفلوکساسین و پرازوسین.

مقدار و نحوه مصرف:

دوز دارو توسط پزشک متخصص و بر اساس شرایط بیمار تعیین می گردد اما به طور معمول مقدار مصرف این دارو بدین صورت می باشد: **درمان فشار خون بالا:** دوز معمول اولیه از ۵ میلی گرم در روز (صبح ها) شروع می شود و در صورت نیاز تا ۱۰ میلی گرم روزانه افزایش می یابد. حداکثر دوز مصرفی ۲۰ میلی گرم در روز می باشد.

نارسایی احتقانی قلب: دوز اولیه ۲/۵ میلی گرم روزانه (صبح ها) می باشد که تا ۱۰ میلی گرم روزانه قابل افزایش است.

شرایط استفاده از دارو:

• نارسایی قلبی مزمن پایدار بدون نارسایی حاد در طی ۶ هفته گذشته

• ثابت بودن شرایط درمان در طول دو هفته گذشته

عوارض جانبی: هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای نیز بشود. گرچه همه این عوارض در یک فرد رخ نمی دهد اما در صورت بروز هرکدام از آن ها با پزشک خود مشورت نمایید: **برادیکاردی، درد قفسه سینه، گیجی، سرگیجه، ضعف، خستگی، سر درد، واکنش های حساسیتی از جمله خارش، راش، بر افروختگی و آنژیوادم، هیپوگلیسمی، درد معده، تهوع، کرامپ شکمی، اسهال، خشکی دهان، ضعف عضلانی، اختلال خواب، افسردگی، سردی دست و پا، افت فشار خون، لکوپنی، احتمال افزایش حساسیت به آلرژن ها و واکنش های آنافیلاکتیک.**

مسمومیت دارویی: در صورت مصرف بیش از مقدار تجویز شده دارو فوراً به بیمارستان مراجعه کنید. افت شدید فشار خون، ضربان کند، مشکل در هدایت الکتریکی قلب، مشکلات قلبی، تنگی نفس، آبی شدن پوست، افت قند خون، سطح بالای پتاسیم در خون، بیهوشی و کما از نشانه های مسمومیت دارویی است.

شرایط نگهداری :

دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

دارو را دور از دید و دسترس اطفال نگهداری نمایید.

بسته بندی: شرکت دارو سازی رها بیزوپرولول را با نام تجاری پروفام® به صورت قرص روکشدار، داخل پلیستر و به همراه برگه راهنما عرضه می نماید.

www.rahapharm.com

TAB.LFT.PRF10/083.01

مصدوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵
فکس: ۰۹۵۹-۳۶۵۴۰۳۱-۳۱(+۹۸)

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی سفه ، واحد ۱
تلفن: ۰۶۵۹-۳۶۵۴۰۳۱-۳۱(+۹۸) فکس: ۰۸۵۹-۳۶۵۴۰۳۱-۳۱(+۹۸)